

Vi måste snabbt ta bort angripna svarta vinbärsbuskar.

Den 10 mars fick föreningen experthjälp från Koloniförbundet för att inspektera svartvinbärsbuskarna på området och se vilka som är angripna av gallkvalster. Kvalstren gör att busken ger mindre och mindre skörd, till slut ingen alls. I en bladknopp finns det tusentals små kvalster och de sprids mycket enkelt till andra buskar.

Typiskt är att en angripen knopp blir rund. En angripen buske måste tas bort innan bladen öppnas på våren. Bäst är om busken grävs upp, läggs i en tät plastpåse och slängs i soporna. Annars sprids kvalster över området till de friska buskarna.

Sammanlagt 56 lotter har angripna buskar. Ulf, trädgårdskonsulenten som gjorde inspektionen, har märkt de angripna buskarna med svart-gul tejp. Eftersom knopparna kommer att öppna sig mycket snart måste föreningen agera snabbt. Om vi får bort gallkvalstren från området går det att plantera nya buskar redan i höst, men helst nästa vår. Det finns några svarta vinbärssorter som är resistent mot gallkvalster.

1. Du som läser detta, gå till din kolonilott den här veckan om du kan. Kontrollera om din svarta vinbärsbuske har en tejpmarkering. Om den har det, klipp bort alla grenar jäms med marken och lägg dem i en plastpåse eller soppåse. Inga bladknoppar får vara kvar på busken. Knyt ihop påsen och släng den, t.ex. i grovsoporna där du bor. När marken tinar måste du gräva upp rötterna och ta bort resten av busken. Den får inte slängas på området.

2. Till helgen kommer styrelsen att börja klippa bort alla grenar och knoppar på de svarta vinbärsbuskar som är markerade och inte har klippts av lottinnehavarna. Vi kan inte se något annat alternativ för att stoppa spridningen. Om du kommer till din lott och hittar en nedklippt svarta vinbärsbuske så var din buske angripen. När marken tinar måste du gräva upp rötterna och ta bort resten av busken. Den får inte slängas på området.

Hälsningar

Styrelsen
2017-03-13